



Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής
Διεύθυνση Υγείας των Ζώων
Τμήμα Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων

Συμβολή των κυνηγών στην επιτήρηση και την πρόληψη της Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων



Η Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων:

- Είναι ιογενές νόσημα του χοίρου και του αγριόχοιρου,
- Έχει επιβεβαιωθεί στα κράτη της βορειανατολικής Ευρώπης, σε ορισμένα κράτη της Κεντρικής Ευρώπης και μετατοπίστηκε τελευταία νοτιότερα στη Ρουμανία και στη Βουλγαρία
- Μεταδίδεται εύκολα και επιβιώνει για μεγάλο διάστημα στο περιβάλλον και στα πτώματα των αγριόχοιρων,
- Μεταδίδεται με άμεση και έμμεση επαφή, μετά από σίτιση με μολυσμένη τροφή, καθώς και με έντομα,
- Προκαλεί μεγάλες οικονομικές απώλειες και προβλήματα στις μετακινήσεις των ζώων και των προϊόντων,
- Προκαλεί μεγάλο ποσοστό θανάτων στους αγριόχοιρους και τους χοίρους.
- **Δε μεταδίδεται στον άνθρωπο.**

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΥΤΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΗΜΑ!!

Συμπτώματα:



- Ανορεξία, κατάπτωση,
- Ταχύπνοια,
- Αποβολές,
- Διάρροια (ίσως αιμορραγική).



- Αιμορραγίες σε διάφορα όργανα,
- Ερυθρότητα του δέρματος, του ρύγχους και των αυτιών,
- Πυρετός,

Αλλοιώσεις στα εσωτερικά όργανα του ζώου:

- Παρουσία υγρού στις κοιλότητες του ζώου
- Διογκωμένοι και αιμορραγικοί λεμφαδένες,
- Αιμορραγίες και οίδημα των πνευμόνων
- Σπλήνας διογκωμένος, σκουρόχρωμος με αιμορραγίες,
- Αιμορραγίες στα εσωτερικά όργανα,
- Διογκωμένο ήπαρ,
- Αποβληθέντα έμβρυα: παρουσία γενικευμένου οιδήματος, πετέχειες σε δέρμα, μυοκάρδιο, σπλήνα, ακόμα και στον πλακούντα.



Σπλήνας διογκωμένος και σκουρόχρωμος.



Υπεραμία του βλεννογόνου του εντέρου.

Η ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΗΜΑΤΟΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ!!

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ (ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ) ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ!!!!

